Formation AVS - EVS

18 AVRIL 2012

Déficiences motrices

- Généralités
- Pathologies rencontrées
- Adaptations nécessaires

Généralités

les mouvements, le déplacement, la posture,
la manipulation, l'écriture, mais aussi la
parole, le regard

SONT DES ACTIVITES MOTRICES

La chaîne du mouvement

Généralités

- Les déficiences motrices peuvent être de degré très variable et entraîner des handicaps qui ne sont pas toujours en rapport avec ce que l'on voit
- Elles peuvent être stables ou évolutives
- Congénitales ou acquises

généralités

La déficience motrice relève de plusieurs origines

- Origine cérébrale:-Infirmité motrice cérébrale:IMC ou IMOC
  - Traumatisme crânien
- Origine neurologiques médullaires ou neuro-musculaires
- Origine ostéo-articulaire

Origine cérébrale

Naissance:

+ prématurité

+ naissance

traumatique:

Infirmité motrice cérébrale:IMC ou
IMOC

Lésions acquises :

+Traumatisme crânien

+Accidents

vasculaires cérébraux

+Tumeurs

Origine cérébrale

C'est la commande nerveuse qui est lésée
à l'origine

+Syndrome spastique: atteinte du cortex pyramidal qui régit les mouvements volontaires

raideur du tonus musculaire atteignant de 2 à 4 membres:lenteur des mouvements,difficulté d'ajustement des postures

+Syndrome athétosique:

atteinte des noyaux gris centraux

mouvements involontaires,
anormaux, lents, irréguliers, touchant
parfois la face, difficulté d'ajustement
des gestes intentionnés

+Syndrome ataxique, atteinte du cervelet

troubles de l'équilibre
et de la marche, difficulté à
coordonner les mouvements

Les différents syndromes peuvent être intriqués

Les atteintes d'origine cérébrale, une fois fixées ne sont plus évolutives

Grande variabilité d'un enfant à l'autre

Origine médullaire

- Traumatismes lésant la colonne vertébrale
- Infections
- Tumeurs

Plus la lésion est haut située plus l'atteinte de la motricité des membres est importante: les membres inférieurs, ou les 4 membres en cas de lésion haute

Anatomie générale du système nerveux

Origine médullaire

- Tétraplégie
- Paraplégie
- Paralysie incomplète si la moelle épinière n'est pas totalement détruite

Avec les troubles moteurs, troubles des sphincters: problèmes urinaires, troubles de la sensibilité

Origine neuro-musculaire, Unité motrice

Origine neuro-musculaire

La plupart sont d'origine génétique

- Amyotrophie spinale infantile
- Neuropathie spinale (Charcot –Marie-Tooth)
- Myasthénie
- Myopathie ou dystrophie musculaire
- La locomotion n'est pas la seule atteinte
- Atteintes associées

ATTEINTES EVOLUTIVES

Origine ostéo-articulaire

Congénitale ou acquise

Malformations

Lésions inflammatoires

Lésions infectieuses

Lésions traumatiques

Troubles associés aux déficiences motrices

- Épilepsie dans les atteintes d'origine cérébrale
  - Troubles neuro-psychologiques
    - + troubles du geste automatique(praxies)
    - + troubles neuro-visuels:
motricité oculaire++ IMC,prématurité
Identification et reconnaissance de la chose vue (gnosies)
      - + langage
      - + mémoire
      - + attention
- .Troubles psycho-affectifs

GRANDE FATIGABILITE

Adaptations à prévoir

Aménagements à prévoir avec les professionnels du soin

- transferts au sein de la classe

- au sein de l'école:toilettes

- repas

(++ intimité)

- installation du poste de travail: attention à la posture, au matériel, attention au confort.

Adaptations, rôle de l'AVS

- Différentes selon situation isolée ou en classe spécialisée
- Ne pas faire à la place, mais toujours proposer quand la motricité est en jeu: graphiques, textes plus longs, oral
- Vérifier l'adaptation de la tâche et la compréhension des consignes

Adaptations

- Organisation: de sa table, de son installation par rapport au reste de la classe: tableau, éclairage, voisinage.
- facilité d'accès à sa table, à ses outils,
- Utilisation du plan incliné,
- vérification des appuis: pieds, menton, bras..

Et encore

- Vérifier l'adaptation des outils aux possibilités de l'enfant
- Toujours favoriser son autonomie
- Et toujours veiller à sa sécurité et à sa fatigue

Rappel sur le son

Bien entendre c'est une boucle audiophonatoire intacte

Selon le niveau d'atteinte de la boucle

Surdité de transmission: oreille externe ou moyenne:-congénitales:aplasie du pavillon,malformation

-acquises:otites

Accessible au traitement médical

Perte de 60 db maxi

Audiogramme d'une surdit (profonde)

Surdit de perception: oreille interne
et/ou voies et centres nerveux

Inaccessibles au traitement mdical

De degr variable: lgres, moyennes,
svres ou profondes

Acquises: ..infections pendant ou aprs la
grossesse

..gntiques

- Surdit mixte si on a une surdit de transmission et une surdit de perception

Déficiences auditives

- Congénitales:-infectieuses
-génétiques
- Acquisies:-infectieuses
-traumatiques

De degré variable
Appareillables ou pas

Dépistage

- À la naissance (Antécédents, tests)
- Pendant la petite enfance
- Après un retard de langage
- Pendant la scolarité, découverte fortuite (surdité unilatérale, par exemple)
- Suite à des infections récidivantes
- Etc...

Degrés de surdité

- Audiogramme
- Audiogramme normal en fonction des âges de la vie

Degrés

Surdit légère:40db

Surdit moyenne: de
40 70 db de perte

Surdit svre:70 90

Surdit profonde plus
de 90 db de perte

compensations

- Appareillage: contours
- L'implant cochléaire
- Les aides techniques: à l'école, liaison haute – fréquence entre le micro porté par le professeur et le récepteur adapté à la prothèse de l'enfant
- LSF
- LPC
- Lecture labiale

Adaptations, préalables

- Pour un élève ayant une surdité sévère ou profonde, nécessité de savoir communiquer en LSF
- Veiller à l'appareillage, encourager son bon entretien

Lecture labiale

- Parler distinctement ,lentement et en pleine lumière
- Veiller à ce que les interlocuteurs soient bien éclairés
- Attention aux contre-jours
- Une seule personne doit parler à la fois
- Ne pas oublier que l'enfant écoute avec ses yeux

S'assurer que

- Consignes comprises, les reformuler, les faire reformuler
- Résumé des cours avec un plan pour guide
- Traduire les locutions imagées qu'il ne peut comprendre
- Etre attentif aux sons proches(homophones) et s'assurer de la discrimination

Les différents troubles de la vue

- La déficience visuelle définie par:
  - état du champ visuel
  - mesure de l'acuité visuelle(AV)

Malvoyant: $AV \leq 4/10$ ème au meilleur oeil
Avec correction

Non voyant, aveugle: $\leq 1/20$ ème ,et champ visuel réduit à 10°

Mal voir, n'est pas rien voir, mais:

-Vision floue de loin:ne voit pas au tableau

ne perçoit pas les affichages muraux

suit mal une activité présentée trop loin de

lui

l'enfant peut s'isoler, paraître distrait

-vision de près altérée:s'approche du document, donc pas de vision globale du document,

l'enfant ne peut anticiper

Autres altérations possibles

- Vision périphérique normale, mais scotome (amputation) central: déplacements faciles, lecture très difficile
- Vision tubulaire: contraire, voit très bien en vision centrale, lecture normale, difficulté dans la prise de repères

Troubles associés

Mal voir s'accompagne de:
Fatigue,
nystagmus,
photophobie,
larmoiement,
difficulté de concentration,
anomalie de la vision des couleurs,
blindisme

Adaptation, rôle de l'AVS

- Pour un non voyant, c'est le personnel spécialisé d'un SESSAD le plus souvent qui renforcera:
  - la locomotion
  - la verbalisation qui aide à décrire
  - veillera à la bonne utilisation du matériel donné (braille)

Pour un enfant mal voyant

Veiller à:

- Place dans la classe,
- déplacements à prévoir dans l'établissement,
- Connaître son environnement: connaissance notamment en collège et lycée, limiter les déplacements, repérer les « pièges »

- A sa posture: dos, plan incliné
- Bonne utilisation des outils spécialisés: agrandisseur, caméra, loupe

- Documents clairs et peu chargés: fractionner les documents
- Fournir des documents imprimés plutôt que de faire écrire

- Utilisation d'une police verdana ou aria réputée pour être plus lisible, à une taille suffisante, avec des interlignes accentuées.
- Importance du contraste des caractères
- Accentuation des lignes, des ponctuations
- Les photocopies doivent être lisibles et contrastées, pas forcément trop grandes (place sur la table, plutôt plusieurs qu'une trop grande)

- Le texte est plus lisible en vérité
(verdana)

Que : ce texte que vous lisez (arial)

aussi

- Veiller à l'éclairage
- Modifier les présentations pour éviter les déplacements trop importants du regard
- Prévenir les fixations du regard, risque de nystagmus
- Veiller à la compréhension des consignes
- Veiller à la fatigue

La dyspraxie

La dyspraxie

- Prévalence : 6%
- Troubles des acquisitions motrices
- Défaut touchant l'organisation des compétences visuo-spatiale
  - Maladresse motrice (coordinations fines)
    - répercussions sur les apprentissages :
      - . Graphisme
      - . Difficultés en géométrie & dans les raisonnements logicomathématique
      - . Acquisition de la lecture
- Troubles de l'exploration visuelle 30 à 40%

Dyspraxie visuo-spatiale

- **Trouble de la réalisation gestuelle** résultant d'une anomalie ou d'un déficit de la perception et/ou de la réalisation de tâches impliquant spécifiquement des notions spatiales.
- **Signes d'appels**
  - maladresse gestuelle
  - difficultés de manipulation dans l'espace
  - difficultés graphiques (lenteur)

- **Acquisition tardive de certaines habiletés motrices**

- s'asseoir, ramper, marcher. Si équilibre précaire → anxiété, peu de plaisir dans les déplacements, diminution de l'exploration spatiale, difficultés dans la pratique des sports (danse, jeux de balle en équipe, vélo, saut à la corde).

- **Difficultés en motricité fine**

- coloriage, dessin, découpe aux ciseaux, jeux de construction

Caractéristiques cliniques

- **Maladresses motrices** (fine et grossière) :
  - chutent, laissent tout échapper, se cognent.
  - La précision des gestes est pauvre
  - maladresse dans l'habillement, dans l'alimentation
  - fonctionnement par « tâtonnements ».

Caractéristiques cliniques (suite)

- **Trouble de la perception spatiale**
  - déficits visuo-spatiaux (relation des objets dans l'espace, mauvaise perception de la vitesse, de la trajectoire, de la localisation d'une balle dans l'espace, mauvaise interprétation des diagonales et des obliques).
- **Trouble de la planification du geste**
- **Trouble du traitement simultané de l'information**
- **Trouble d'acquisition du schéma corporel**
  - défaut d'intégration sensori-motrice)

Répercussions scolaires

- ✓ Mauvaise préhension du crayon (↓ calligraphie).
- ✓ Mauvaise organisation dans l'espace (feuille).
- ✓ Difficultés pour l'écriture des lettres avec obliques (V, W,...).
- ✓ Effort supplémentaire :écrire accapare les ressources attentionnelles.
- ✓ Problèmes pour la lecture de textes, des nombres
- ✓ Difficultés en géométrie, pour les algorithmes mathématiques.
- ✓ Difficultés en sport.

Répercussions psycho-affectives

- ✓ Diminution de l'estime de soi.
- ✓ Recherche de relations avec les plus jeunes.
- ✓ Image de « paresseux » et « d'incompétent ».
- ✓ Repli sur soi.
- ✓ Intolérance à la frustration et cpt d'opposition
- ✓ Sentiment d'insécurité et mauvaise image de soi → dépendance accrue envers l'adulte.
- ✓ Passivité dans les situations nouvelles

Démarche diagnostique

- **Anamnèse**

- prématurité (< 32 semaines), PN < 2000 grs
- troubles oculomoteurs et/ou attentionnels associés

- **Evaluation psychométrique**

- dissociation verbal/performance ICV <<< IRP
- profil qualitatif
  - WPPSI-R (carrés, figures géométriques, labyrinthes)
  - WISC-III (cubes, assemblages d'objet, labyrinthes, codes)

- **Bilan neuropsychologique**

- épreuves complémentaires d'évaluation des praxies et des fonctions exécutives ; test d'attention

Examens complémentaires

- **Bilan neuropédiatrique**

- **signes neurologiques mineurs**

- . défaut de latéralisation
    - . syncinésies
    - . dysdiadoocinésies

- **Bilan orthoptique**

- Regard, poursuite oculaire, fixation et saccade oculaire

- **Bilan psychomoteur et/ou ergothérapeutique**

Principes de prise en charge

- **Sur le trouble dyspraxique**
  - Rééducation psychomotrice
  - Rééducation graphomotrice
  - Ergothérapie
- **Sur les troubles oculo-moteurs**
  - Rééducation orthoptie
- **Sur les troubles en lecture et logico-mathématique**
  - Rééducation orthophonique

Mesures psychopédagogiques

- ✓ Soulager le rapport à l'écrit (photocopies, ordinateur, 1/3 temps)
- ✓ Améliorer le rapport à l'écrit (tenue du stylo, roller, ligne espacées)
- ✓ Améliorer la qualité des productions écrites (présentation, surligneur, « espaces balisés »)
- ✓ Evaluation des connaissances à l'oral (ne pas sanctionner outre mesure les fautes d'orthographe, la dysgraphie)
- ✓ Valoriser les matières littéraires
- ✓ Tenir compte des déficits associés (attention, dyslexie)

Contourner les difficultés liées à l'écrit ,aide de l'AVS

- Utiliser les gommettes
- Les étiquettes
- Les points

(l'enfant perd de l'énergie et du temps à entourer)

Pour les exercices de repérage, d'assemblage

dénombrer

- Il compte plusieurs fois le même objet:
  - pointer pour lui chaque objet
  - mettre de côté l'objet compté

Se repérer

- Lui proposer au départ des lettres en relief, qu'il pourra repérer par le toucher, pour apprendre à les connaître
- Mettre un point de repère en haut à gauche de la feuille pour aider au démarrage de son écrit
- Lui présenter les exercices un à un

Se repérer sur un tableau

- Coloriser les colonnes
- Encourager à utiliser des « caches » glissant dans le plan des colonnes verticales et horizontales

mathématiques

- Apprendre à aligner les chiffres en tableau de centaine, dizaine, unité.
- Aider à tenir la règle
- Apprendre à verbaliser la tâche à effectuer
- Formuler les consignes en les fractionnant en éléments simples

Tâches récurrentes

- Étiquettes -mots:jour de la semaine,mois
- Solliciter la mémoire visuelle,apprendre à épeler
- Limiter les parasites visuels:table vide,outils rassemblés(gobelet)
- Apprendre à organiser le cartable(couleurs)
- Surligner,souligner selon les consignes

Soulager sa fatigue

- Photocopies, pour les cours trop longs, donner du temps supplémentaire
- Mais ne pas supprimer les récréations....